

Ils sont identifiés par le logo ci-dessus.
Le choix est basé sur :

La dangerosité

La consommation

L'emballage

Les solutés hypertoniques

KCl,
NaCl 10% et 20%,
G 30%,
Calcium gluconate
Sulfate et Chlorure de Magnésium
Bicarbonate de sodium

Les AVK

Acénocoumarol (Sintrom®),
Fluindione (Préviscan®),
Warfarine (Coumadine®)

Les anticoagulants oraux directs

Apixaban (Eliquis®)
Rivaroxaban (Xarelto®)
Dabigatran (Pradaxa®)

Les antalgiques opiacés

Fentanyl transcutané (Durogésic®,
Matrifen®)
Morphine et Oxycodone injectable

Les neuroleptiques

Halopéridol (Haldol®),
Levomépronazine (Nozinan®),
Cyamemazine (Tercian®)
Tiapride (Tiapridal®)
Amisulpride (Solian®),
Valproate de Na (Dépakine®),
Divalproate (Dépakote®) et Valpromide
(Dépamide®)
Olanzapine (Zypadhera®, Zyprexa®)
Clozapine (Leponex®)

Les insulines

Insuline asparte (Fiasp®, Novorapid®)
Insuline lispro (Humalog®)
Insuline glulisine (Apidra®)
Insuline humaine et NPH (Umuline®)
Insuline détémir (Levemir®)
Insuline glargine (Abasaglar®, Toujeo®)
Insuline dégludec et liraglutide
(Trésiba®, Xultophy®)